



Transpozice ovaríí u mladých žen s ca cervicis uteri

Ľubušký M., Ľubušký D., Machač Š., Kudela M.
Gynekologicko porodnická klinika FN Olomouc



Přínosy a rizika transpozice ovaríí u mladých žen s Ca cervicis uteri jsou dosud předmětem diskusí. Na našem pracovišti jsou v indikovaných případech prováděny transpozice ovaríí od roku 1990. Cílem práce je vyhodnocení výsledků této operace u našich nemocných.

V letech 1990 - 2002 byla na našem pracovišti provedena transpozice ovaríí u 88 pacientek operovaných pro onemocnění karcinomem hrdla děložního. U všech byla provedena radikální hysterektomie sec. Wertheim s pánevní lymfadenektomií sec. Meigs. Ovaria byla transponována kraniálně nad oblast pánve, s cílem zachovat jejich funkci i v případě následné radioterapie. Věk pacientek se pohyboval od 23 do 47 let (medián 35,4). Ve 20 případech se jednalo o stadium IA2 (22,7%), v 61 případech o stadium IB1 (69,3%), ve 3 případech o stadium IB2 (3,4%) a ve 4 případech o stadium IIA (4,6%). Histopatologicky byl diagnostikován v 84 případech spinocelulární karcinom (95,4%) a ve 4 případech adenokarcinom (4,6%).

Kontroly ovaríí byly prováděny ultrazvukem, vzhledem k lokalizaci po transpozici jsou snadno vizualizovatelná přes břišní stěnu abdominální sondou. V pěti případech byly zaznamenány v transponovaných ovaríích přechodné cystické změny, které ve dvou případech vedly k následné ovarektomii. Histopatologický nálezn byl bez známek malignity. Metastatické postižení transponovaných ovaríí jsme v námi sledovaném souboru dosud nedagnostikovali. Třileté přežití bylo dosaženo v 97,3% (70/72), pětileté v 93,5% (58/62).

ZÁVĚR:

Neprokázali jsme negativní ovlivnění prognózy základního onemocnění v důsledku transpozice ovaríí. Vzhledem k počtu pacientek v našem souboru však nelze dosud vyvozovat definitivní závěry.

